

کرم لیدوکائین / پریلوکائین - گیلارانکو

لیدوکائین ۲/۵ درصد / پریلوکائین ۲/۵ درصد

دسته دارویی:

بیحس کننده موضعی

موارد مصرف:

کرم لیدوکائین / پریلوکائین جهت ایجاد بی حسی موضعی کوتاه مدت بر روی پوست سالم بکار می رود. این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران خودداری نمایید.

نحوه مصرف:

نحوه دقیق مصرف را پزشک و تجویز کننده اعلام می کند اما اطلاعات مصرف عمومی به شرح زیر می باشد.

■ بر روی پوست یا مخاط سالم استفاده نمایید. ■ برای انجام عملیات بر روی پوست، کرم را بصورت یک لایه نازک بر روی پوست استعمال نمایید و در صورت توصیه پزشک منطقه استعمال شده را با یک لایه پوشش پلاستیکی یا پوشش مناسب دیگر بپوشانید. این لایه بلافاصله قبل از شروع عملیات از روی پوست برداشته می شود و کرم باقیمانده بر سطح پوست نیز قبل از عملیات از روی پوست پاک می شود.

جدول میزان مصرف:

سن	مورد مصرف	مقدار مصرف	مدت تماس با پوست	دفعات استعمال
بزرگسالان و افراد ۱۲ سال به بالا	بی حسی برای عمل های کوچک	۲ گرم	حداقل یک ساعت حداکثر ۵ ساعت	بر حسب نیاز
بزرگسالان و افراد ۱۲ سال به بالا	مصرف در ناحیه تناسلی	۲ گرم	کمتر از ۵ دقیقه	بر حسب نیاز
نوزادان ۰-۲ ماه	تزییق یا عملیات کوچک	۱ گرم (کمتر از 10cm^2 پوشش پوست بدن)	کمتر از یک ساعت	حداکثر یکبار در روز
اطفال ۳-۱۱ ماه	تزییق یا عملیات کوچک	حداکثر ۲ گرم (کمتر از 20cm^2 پوشش پوست بدن)	کمتر از یک ساعت	حداکثر ۲ بار در شبانه روز
کودکان ۱-۵ سال	تزییق یا عملیات کوچک	حداکثر ۱۰ گرم بر روی کل پوست (کمتر از 100cm^2 از سطح)	کمتر از یک ساعت	حداکثر ۲ بار در شبانه روز
کودکان ۶-۱۱ سال	تزییق یا عملیات کوچک	حداکثر ۱۰ گرم بر روی کل پوست (کمتر از 200cm^2 از سطح)	۱ ساعت (حداکثر ۵ ساعت)	حداکثر ۲ بار در شبانه روز

موارد منع مصرف:

- ۱- حساسیت به پریلوکائین و لیدوکائین یا هریک از اجزای فرمول ۲- استعمال در داخل چشم ۳- استعمال در داخل گوش
- ۴- در کمبود آنزیم G6PD و کودکان نارس کمتر از ۳۷ هفته و کودکان کمتر از ۱۲ ماهه که متهموگلوبینی دارند.

هشدارها:

- ۱- از تماس دارو با چشم‌ها ممانعت کنید. ۲- فقط بر روی ناحیه مورد نظر استفاده شود.
- ۳- قبل از مصرف پزشک یا داروساز را در جریان موارد زیر بگذارید.
 - در صورت کمبود آنزیم Glucose 6-phosphatase (فاویسم) ■ اگر حساسیت‌های پوستی (Atopic dermatitis) دارید.
 - بریدگی، زخم باز، جوش ■ اگر داروهای تنظیم کننده ضربان قلب مانند آمیودارون و سوتالول مصرف می‌کنید.
- ۴- به دلیل کمبود اطلاعات و بررسی در ناحیه تناسلی کودکان کمتر از ۱۲ سال استفاده نشود.
- ۵- در کودکان کمتر از ۱۲ ماه که همزمان داروهای القا کننده متهموگلوبینی مصرف می‌کنند، مصرف نشود.
- ۶- کرم لیدوکائین/پریلوکائین در بیمارانی که داروهای ضد آرتیمی قلبی کلاس I مانند توکاینید و مگزلیتین مصرف می‌کنند با احتیاط مصرف گردد. زیرا این دارو سبب تقویت اثر هم و ایجاد اثرات سمی دارویی می‌کند.

تداخلات دارویی:

مصرف همزمان با داروهای القا کننده متهموگلوبینی مانند گروه نیترات‌ها، بی‌حس کننده‌های موضعی، آنتی بیوتیک‌ها مانند داپسون، سولفونامیدها، داروهای ضد مالاریا مانند کلرکین و پریماکین، نیتروفرانتوئین.
داروهای ضد تشنج مانند فنوبیتال، فنی توئین سدیم والپروات و سایر داروها مانند استامینوفن، متوکلوپرامید، سولفاسالازین و کلینین منجر به تداخلات دارویی می‌گردد.

مصرف در بارداری:

اگرچه جذب لیدوکائین-پریلوکائین از موضع بسیار کم می‌باشد ولی مصرف باید با توصیه و مشورت با پزشک باشد.
لیدوکائین و پریلوکائین به میزان بسیار ناچیز وارد شیر می‌شوند، قبل از مصرف در هنگام شیردهی با پزشک مشورت نمایید.

عوارض جانبی:

- ۱- در صورت بروز علائم زیر فوراً با پزشک تماس حاصل نمایید.
تغییر رنگ پوست به دلیل کمبود اکسیژن- تنگی نفس- کاهش فشار خون و تغییر ضربان قلب
- ۲- عوارض شایع که بصورت عمومی در مصرف بی‌حس کننده‌های موضعی ایجاد می‌شوند: شامل: واکنش خفیف پوستی مانند احساس سوختگی یا خارش، قرمزی و ورم پوست بصورت گذرا می‌باشد.
- ۳- عوارض غیرشایع مانند تحریک پوست و احساس گرما در محل استعمال دارو می‌باشند.
- ۴- عوارض نادر مانند واکنش‌های حساسیتی که ممکن است به سمت شوک آنافلاکسی برود، واکنش‌های خونی، متهموگلوبینمیا و خونریزی‌های نقطه‌ای در محل استعمال می‌باشند.

شرایط نگهداری:

■ دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

■ در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری شود.

■ از یخ زدگی محافظت گردد.

مرجع:

1-PDR.net

2-FDA label Approved