

موپیروسین - گیلارانکو ۲ درصد پماد موضعی

دسته دارویی:

ضدباکتری موضعی

فارماکولوژی:

موپیروسین یک آنتی بیوتیک طبیعی بوده که در اثر واکنشهای تخمیری در سوش پسودوموناس فلوروسنس تولید می شود. موپیروسین موثر برروی سوشهای استافیلوکوکوسهای مقاوم به متی سیلین و برخی باکتریهای گرم منفی می باشد. موپیروسین بطور اختصاصی و برکشت پذیر با اتصال به آنزیم ایزولوسیل ترنسفر- RNA سنتتاز سبب مهار ساخت پروتئین RNA در باکتری ها می شود. در بررسی های بالینی و آزمایشگاهی بعمل آمده، مشخص شده که موپیروسین بر علیه سوشهای استافیلوکوک اورئوس و استرپتوکوک پیوژن موثر بوده است.

موارد مصرف:

موپیروسین در درمان موضعی زرد زخم ناشی از استرپتوکوک پیوژن و استافیلوکوک اورئوس کاربرد دارد. در درمان فولیکولیت و آکنهای عفونی محدود ناشی از استافیلوکوک اورئوس نکار می رود و همچنین در درمان عفونت های ثانویه جراحات محدود پوستی (با ۱۰ cm طول و یا ۱۰۰ سانتی متر مربع سطح) که ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس یا استرپتوکوکوس پیوژن باشند، بکار می رود.

مقدار و نحوه مصرف :

قبل از مصرف ناحیه مورد نظر را با آب و صابون شستشو داده و به آرامی خشک نمایید. مقدار کمی از پماد موپیروسین را به ناحیه مورد نظر بمالید می توانید با گاز استریل آن را پوشش دهید. پماد موپیروسین را سه بار در روز استفاده نمایید.

مصرف در بارداری و شیردهی:

پماد موپیروسین از نظر مصرف در بارداری در گروه B داروهای قابل مصرف قرار دارد. بدلیل جذب پوستی بسیار پایین امکان ترشح دارو در شیر بسیار کم می باشد.

هشدارها و احتیاطات:

- به هیچ وجه در چشم مصرف نشود.
- در صورت بروز تحریک پوستی یا حساسیت در اثر مصرف موپیروسین درمان قطع و درمان های جایگزین آن استفاده شود.
- مصرف طولانی مدت آن باعث عفونت های فرصت طلب از قبیل قارچ می شود.

■ در صورت وجود زخم باز و سوختگی وسیع ، بعلت جذب پلی اتیلن گلیکول بخصوص در افراد با نارسایی کلیه موپیروسین توصیه نمی شود.

■ ارزیابی بیماران پس از ۳ - ۵ روز استفاده از پماد موپیروسین باید صورت گیرد.

عوارض جانبی:

توجه: پلی اتیلن گلیکول موجود در پماد می تواند سبب تحریک پوستهای آسیب دیده و مخاط گردد.

واکنشهای موضعی از قبیل سوزش یا درد، خارش، لکه های پوستی، تهوع ، خشکی پوست، حساسیت موضعی ، ورم، درماتیت تماسی ذکر شده است (در کمتر از ۱/۵ % موارد).

بسته بندی :

پماد موپیروسین در تیوبهای ۱۵ گرمی و در داخل جعبه موجود است.

شرایط نگهداری:

در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری شود. از یخ زدگی محافظت گردد.

منبع : USPDI 2007

www.gilaranco.com
Email: info@gilaranco.com
@gilaranco
@gilaranco1

شرکت داروسازی گیلارانکو
ایران - رشت

