



ایران - شرکت داروسازی گیلارانکو

www.gilaranco.com
Email: info@gilaranco.com
@gilaranco
@gilaranco-pharma

نیکسامل® ۱ درصد پرمتین کرم موضعی

دسته دارویی:
ضد شپش

موارد مصرف:

کرم مو قابل شستشوی نیکسامل® بعنوان داروی خط اول برای درمان آلودگی ناشی از شپش سر انسانی بکار برده می شود.

مقدار و نحوه مصرف:

مصرف در بزرگسالان: مصرف معمولاً یکبار این دارو اغلب برای بیماران مبتلا به شپش سر نتیجه درمانی مثبت دارد. هنگام استفاده از این دارو به هیچ وجه از درمان های سنتی مانند استفاده از سرکه و... بدلیل احتمال کاهش اثر دارو استفاده نگردد. ضمناً مصرف این دارو در انسان کمترین حد سمیت را نسبت به سایر فرآورده های مشابه دارد.

طریقه مصرف:

ابتدا باید موها را با یک شامپو (بدون نرم کننده و حالت دهنده) بخوبی بشوید و سپس موها را بخوبی آب کشیده و تا حدی که فقط آب موها گرفته شود، خشک نمایید. آنگاه مقدار کافی از کرم نیکسامل® روی موهای نم دار استفاده نمایید تا تمام موها و پوست سر به خوبی به کرم آغشته شود.

دقت کنید موهای پشت گردن و پشت گوش ها را کاملاً به کرم آغشته کرده باشید.

بعد از اتمام استعمال اجازه دهید ۱۰ دقیقه کرم بر روی مو باقی بماند سپس موها را با آب گرم به خوبی آب بکشید و با یک حوله موها را خشک نمایید. تا دو روز از شستشوی مو خودداری نمایید. اگر پس از یک هفته شپش زنده در موی سر مشاهده شد، درمان تکرار شود.

نحوه شانه کردن با شانه دندانه ریز برای جدا نمودن بقایای شپش:

در حالی که موها مرطوب هستند، موهای سر را به چند قسمت تقسیم نموده و هر قسمت را طبق روش زیر شانه نمایید.

3.3cm

5.73 cm

-مصرف در کودکان بالاتر از ۲ ماه: به روش مصرف بزرگسالان مراجعه شود.
-برای کودکان زیر ۲ ماه مصرف نشود.
-مصرف در کودکان:
در دوران بارداری ده B می باشد.
مصرف در بارداری:

2015 Drug facts and comparisons
منبع:

نکات قابل توصیه:

- ۱- تمام لباسها، ملحفه ها و حوله های بیمار باید با آب داغ شسته و یا با اسپری ویژه البسه درمانی® آغشته گردد.
- ۲- تمامی افراد خانواده فرد مبتلا نیز همزمان باید درمان گردند.
- ۳- برای جلوگیری از گسترش آلودگی، رفع آلودگی شانه و برس را نیز با اسپری درمانی® انجام دهید.
- ۴- از تماس دارو با چشم ها، دهان و مخاط خودداری گردد.
- ۵- از مصرف کرم مو قابل آبکشی نیکسامل® بطور معمولی و مرتب اجتناب شود.
- ۶- این دارو برای استعمال خارجی است.
- ۷- دور از دسترس اطفال نگهداری گردد.
- ۸- از مصرف دارو روی زخمهای باز، خراشیدگی و بریدگیها اجتناب گردد.
- ۹- برای پیشگیری و آلودگی مجدد و گسترش آلودگی با داروساز خود مشورت نمایید.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی خود اثرات جانبی را نیز به همراه دارد که تمامی این عوارض به یکباره در یک فرد ظاهر نمی شود. احساس سوزش، گزش، اریتم و راش ممکن است ظاهر شود.

هشدار:

کرم مو قابل آبکشی نیکسامل® در افرادی که حساسیت ویژه به این محصول یا ترکیبات آن یا سایر پیرتروئیدها دارند، منع مصرف دارد.

12.9 cm