

Nixamol® 1%

Permethrin



Topical Cream (For hair)

Includes Comb

Nixamol® Cream Rinse 1% has been prescribed by your doctor to help you get rid of head lice and crablice. These are very tiny bug – like animals that may have caused you discomfort and itching. When used properly Nixamol® Cream Rinse will work. But you need to be careful to follow these directions exactly if you are the one using Nixamol® Cream Rinse or if you are supervising the use of Nixamol® for a child. Here are the general directions for its use but, if your doctor has given you other directions, follow those directions carefully.

Before you use Nixamol® Cream Rinse:

- Children must not apply Nixamol® Cream Rinse without adult supervision.
- Do not leave Nixamol® Cream Rinse on hair for more than 10 minutes before rinsing thoroughly.
- Do not take Nixamol® Cream Rinse internally.
- Keep Nixamol® Cream Rinse away from mouth and eyes.
- Do not use Nixamol® Cream Rinse if there are open wounds, cuts or sores on the skin—unless your doctor specifically tells you to.
- When removing nits (eggs) use a nit comb or tweezers.
- Avoid unnecessary contact with your skin if you are applying Cream Rinse to another person. If treating more than one person the person applying Nixamol® Cream Rinse (especially pregnant and / or nursing women) should wear rubber gloves.
- All recently worn clothing, underwear and pajamas used sheets, pillow cases, and towels should be washed in very hot water or dry cleaned.
- Do not use oil treatment or oil – based hair dressings, or conditioners immediately before or after applying Nixamol® Cream Rinse.
- Do not reapply Nixamol® if itching continues after first use. Itching after application of Nixamol® Cream Rinse may not be due to lice but may be a normal sensation after successful treatment. Do not reapply without first obtaining the advice of your doctor.
- Do not reapply Nixamol® Cream Rinse because you may think that " more is better."
- Additional Nixamol® Cream Rinse applied beyond the recommended amount may be harmful.
- Do not use near the eyes, inside the nose, ear, mouth or vagina.
- Nixamol® Cream Rinse can be poisonous if not used properly.
- Cream Rinse is contraindicated in individuals with known hypersensitive to the product, its component and other pyrethroids or pyrethrin.
- * Washing in hot water all personal articles susceptible to infestation (sheets, pillows, clothing, combs, brush). It is recommended to thoroughly vacuum rooms.
- How to use Nixamol® Cream Rinse:**
- 1- Shampoo hair with your regular shampoo rinse (no conditioner) and towel dry .
- 2- Work thoroughly into hair and leave on hair for ten(10) minutes.
- 3- Immediately rinse with warm water thoroughly.
- 4- Avoid unnecessary contact of cream rinse with other areas of your skin.
- 5-Dont wash your hair for two days after treatments.
- 6- Remove nits (eggs) using a nit comb or tweezers.
- * **Lactation:** It is not know whether this drug is excreted in breast milk. Because of the evidence for tumorigenic potential of Permethrin in animal studies, consider discounting nursing temporarity or withholding the drug while the mother is nursing.
- * **Children:** Safety and efficacy for use in children younger than 2 month of age have been established.

Reference:
Drug facts and comparisons 2015



Gilaranco Pharmaceutical Co.
Rasht- Iran

نیکسامل® ۱ درصد

پرمترین



همراه با شانه دندانه ریز

دسته دارویی:

ضد شپش

موارد مصرف:

کرم مو قابل شستشوی نیکسامل بعنوان داروی خط اول برای درمان آلودگی ناشی از شپش سر انسانی بکار برده می شود.

مقدار و نحوه مصرف:

مصرف در بزرگسالان: مصرف معمولاً یکبار این دارو اغلب برای بیماران مبتلا به شپش سر نتیجه درمانی مثبت دارد. هنگام استفاده از این دارو به هیچ وجه از درمان های سنتنی مانند استفاده از سرکه و... بدلیل احتمال کاهش اثر دارو استفاده نگردد. ضمناً مصرف این دارو در انسان کمترین حد سمیت را نسبت به سایر فرآورده های مشابه دارد.

طریقه مصرف:

ابتدا باید موها را با یک شامپو (بدون نرم کننده و حالت دهنده) بخوبی بشویید و سپس موها را بخوبی آب کشیده و تا حدی که فقط آب موها گرفته شود، خشک نمایید. آنگاه مقدار کافی از کرم نیکسامل روی موهای نم دار استفاده نمایید تا تمام موها و پوست سر به خوبی به کرم آغشته شود.

دقت کنید موهای پشت گردن و پشت گوش ها را کاملاً به کرم آغشته کرده باشید.

بعد از اتمام استعمال اجازه دهید ۱۰ دقیقه کرم بر روی مو باقی بماند سپس موها را با آب گرم به خوبی آب بکشید و با یک حوله موها را خشک نمایید. تا دو روز از شستشوی مو خودداری نمایید. اگر پس از یک هفته شپش زنده در موی سر مشاهده شد، درمان تکرار شود.

نحوه شانه کردن با شانه دندانه ریز برای جدا نمودن بقایای شپش:

در حالی که موها مرطوب هستند، موهای سر را به چند قسمت تقسیم نموده و هر قسمت را طبق روش زیر شانه نمایید.

ابتدا موی سر را با شانه معمولی شانه کنید تا موها صاف و گره مو باز شود. سپس نوک شانه دندانه ریز را به سمت خود گرفته و مقداری از مو را از کف سر به صورتی که شانه ابتدا چسبیده به کف سر باشد، به سمت انتهای مو شانه نمایید. بعد از هر بار شانه کردن با دستمال کاغذی شپش ها را از شانه جدا کنید و دستمال کاغذی را در کیسه پلاستیکی بریزید. موهای شانه شده را با یک کلیپس از قسمت های شانه نشده جدا نموده و قسمت های دیگر مو را به همین ترتیب تا شانه شدن تمامی موها ادامه دهید. سپس کلیپس ها را جدا نموده و مجدداً موها را با آب گرم شستشو دهید.

نکات قابل توصیه:

- ۱- تمام لباسها، ملحفه ها و حوله های بیمار باید با آب داغ شسته و یا با اسپری ویژه البسه درمان آغشته گردد.
- ۲- تمامی افراد خانواده فرد مبتلا نیز همزمان باید درمان گردند.
- ۳- برای جلوگیری از گسترش بیماری، آلودگی شانه و برس را با اسپری درمان بر طرف کنید.
- ۴- از تماس دارو با چشم ها، دهان و مخاط خودداری گردد.
- ۵- از مصرف کرم مو قابل آیکشی نیکسامل بطور معمولی و مرتب اجتناب شود.
- ۶- این دارو برای استعمال خارجی است.
- ۷- دور از دسترس اطفال نگهداری گردد.
- ۸- از مصرف دارو روی زخمهای باز، خراشیدگی و بریدگیها اجتناب گردد.
- ۹- برای پیشگیری از آلودگی مجدد و گسترش آلودگی با داروساز خود مشورت نمایید.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی خود اثرات جانبی را نیز به همراه دارد که تمامی این عوارض به یکبار در یک فرد ظاهر نمی شود. احساس سوزش، گزش، اریتم و راش ممکن است ظاهر شود.

هشدار:

کرم مو قابل آیکشی نیکسامل در افرادی که حساسیت ویژه به این محصول یا ترکیبات آن یا سایر پیروتریویدها دارند، منع مصرف دارد.

مصرف در بارداری:

در دوران بارداری رده B می باشد.

مصرف در کودکان:

Reference:
Drug facts and comparisons 2015

www.gilaranco.com
Email: info@gilaranco.com
@gilaranco
@gilaranco1



شرکت داروسازی گیلارانکو
ایران - رشت