

کلوبتازول – گیلارانکو ۰/۰۵ درصد

کلوبتازول

پماد موضعی

توجه: این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، از مصرف آن در موارد مشابه و توصیه مصرف آن به سایرین خودداری نمایید.

موارد مصرف:

پماد کلوبتازول – گیلارانکو ۰/۰۵ درصد یک کورتیکواستروئید بسیار قوی موضعی است که در درمان التهاب و خارش پوستی که به کورتیکواستروئیدها پاسخ می دهند در افراد بالای ۱۲ سال کاربرد دارد. درمان حداکثر برای ۲ هفته ادامه یابد و حداکثر مقدار داروی مصرف شده نباید بیشتر از ۵۰ گرم در هفته باشد.^۱

مقدار و نحوه مصرف:

دارو باید ۲ بار در روز بر روی پوست مناطق مورد نظر مالیده شود.

نکات قابل توجه:

- از تماس فرآورده با مناطقی از بدن که مبتلا به بیماری نیست خودداری نمایید و در صورت تماس اتفاقی آن را با آب فراوان بشویید.
- این دارو باید تحت نظر پزشک استفاده گردد و نباید بیش از دوره تعیین شده توسط پزشک (حداکثر ۲ هفته متوالی) مصرف گردد.

- از پانسمان نمودن یا استفاده از هرگونه پوششی بر روی مناطقی از پوست که تحت درمان با این دارو قرار گرفته اند خودداری نمایید.
 - پس از استفاده از این دارو دست ها را با آب کافی بشویید.
 - در صورت در پیش داشتن عمل جراحی پزشک خود را از مصرف این دارو مطلع سازید.^{۱،۲}
- هشدار:

کلوبتازول پروپیونات یک کورتیکواستروئید بسیار قوی است که باعث مهار محور HPA در کمترین مقدار آزمایش شده می گردد. جذب سیستمیک کورتیکواستروئیدهای موضعی می توانند مهار برگشت پذیر محور هایپوتالامیک - هیپوفیز - آدرنال را سبب گردد و امکان ناکارآمدی این محور را پس از قطع درمان باعث شود.^{۱،۲}

بیمارانی که از استروئیدهای موضعی در مناطق وسیع یا پوشیده استفاده می کنند باید به صورت دوره ای از نظر مهار محورهایپوتالامیک – هیپوفیز – آدرنال مورد ارزیابی قرار گیرند. در صورت مشاهده مهار محور HPA باید تواتر مصرف کاهش یابد یا از استروئیدی با قدرت کمتر استفاده گردد .

در کودکان به علت بالاتر بودن نسبت سطح بدن به وزن امکان سمیت افزایش می یابد.^{۱،۲}

در صورت بروز حساسیت، مصرف این دارو باید متوقف گردد.^{۱،۲}

مصرف این دارو در بیماران زیر ۱۲ سال توصیه نمی گردد.^{۱،۲}

منع مصرف:

این دارو در بیماران حساس به کلوبتازول پروپیونات، سایر کورتیکواستروئیدها یا هر یک از اجزاء تشکیل دهنده نباید مصرف گردد.^۱ این دارو بر روی مناطقی از پوست که دچار عفونت باکتریایی، ویروسی، قارچی یا انگلی هستند، نباید مصرف شوند.^۲

عوارض جانبی:

جذب پوستی کورتیکواستروئیدها می تواند سبب عوارض سیستمیک مانند هایپرگلیسمی، گلوکزوری و مهار برگشت پذیرمحورهایپوتالامیک – هیپوفیز – آدرنال گردد.

عوارض با وقوع کم یا نادر:

درماتیت تماسی، فولیکولیت، آکنه، خشکی پوست، آتروفی پوست، عفونت ثانویه پوست.

بارداری:

گروه C^۳

شیردهی:

ترشح کورتیکواستروئیدهای موضعی در شیر مشخص نشده است. بهتر است مصرف این دارو در مادران شیرده با احتیاط انجام پذیرد.

شرایط نگهداری:

در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری نمایید.

از یخ زدگی محافظت گردد.

1-Physicians'Desk References 60 edition

2- USPDI 2007

www. gilaranco.com

Email: Info@gilaranco.com

@gilaranco

@gilaranco_pharma

شرکت داروسازی گیلارانکو

ایران – رشت

