

## پودر برای محلول خوراکی



سدیم پیکوسولفات / منیزیم اکساید / سیتریک اسید

با ملعم پرتقال

این محصول یک ملین محرک است که به منظور پاکسازی روده ها جهت اعمال تشخیصی در بزرگسالان بکار می رود.

**مقدار و نحوه مصرف:**

هر پاکت دارو را در ۱۵۰ میلی لیتر آب حل نمایید.

**دو روش برای مصرف دارو پیشنهاد می گردد.**

**روش اول:** مصرف دارو در روز قبل از کلونوسکوپی و صبح روزی که باید کلونوسکوپی انجام شود.

۱- یک پاکت دارو را روز قبل از کلونوسکوپی بین ساعت ۵ بعدازظهر تا ۹ شب میل کنید.

۲- حداقل ۱۰ دقیقه صبر کنید و سپس طی ۵ ساعت تا زمان خواب ۵ لیوان مایعات شفاف ( به جز شیر - غذای جامد - آب میوه های حاوی پالپ - آب میوه های رنگی) میل کنید.

۳- پاکت دوم را صبح روز بعد تقریباً ۵ ساعت قبل از شروع کلونوسکوپی در ۱۵۰ میلی لیتر آب حل نموده و میل کند.

۴- حداقل ۱۰ دقیقه صبر کنید و ۳ لیوان آب یا مایعات شفاف را طی ۵ ساعت میل کنید و تا ۲ ساعت قبل از کلونوسکوپی دیگر مایعات میل نشود.

**روش دوم:** مصرف هر ۲ پاکت در روز قبل از انجام کلونوسکوپی

۱- پاکت اول را در ۱۵۰ میلی لیتر آب حل کرده و بعدازظهر روز قبل از کلونوسکوپی بین ساعت ۴ تا ۶ عصر میل کنید پس از ۱۰ دقیقه ۵ لیوان پر مایعات شفاف (به جز شیر - غذای جامد آب میوه های حاوی پالپ - آب میوه های رنگی) طی ۵ ساعت میل کنید.

۲- ساعت بعد از مصرف پاکت اول، بین ساعت ۱۰ شب تا ۱۲ نیمه شب همان روز پاکت دوم را در ۱۵۰ میلی لیتر آب حل و میل نمایید و حداقل ۱۰ دقیقه صبر نموده و ۳ لیوان پر مایعات شفاف طی ۵ ساعت تا موقع خواب میل نمایید.

در صورتیکه بعد از مصرف پاکت اول دچار درد شکم و نفخ شدید شده باشید صبر کنید تا ملایم درد و ناراحتی برطرف شده و سپس مصرف پاکت دوم را شروع کنید.

**هشدار و احتیاطات:**

۱- در هر یک از موارد ذیل قبل از مصرف این دارو پزشک تان را مطلع نمایید.

- چنانچه داروهای مدر، کورتیکواستروئید، ضد التهاب های غیراستروئیدی، لیتیوم و داروهای ضدصرع مصرف می نمایند یا سابقه تشنج داشته اید.

- جراحی سیستم گوارشی داشته اید.

- دچار نارسایی کلیوی، کم فشاری خون، نارسایی احتقانی قلب، بی نظمی ضربان قلب می باشید.

- دارای اختلال در سیستم گوارشی معده و روده هستید.

- اگر باردار هستید یا در حال شیردادن به نوزاد هستید.

۲- این دارو به هیچ عنوان بصورت خشک و بدون رقیق کردن با آب میل نگردد.

۳- مصرف آب و الکترولیت قبل، حین و بعد از مصرف پیکوسولفات خصوصاً در بیماران مسن و بیماران کلیوی و در معرض کاهش شدید سدیم یا پتاسیم مورد توجه قرار گیرد.

۴- دوره تخلیه کولون نباید بیش از ۳۴ ساعت به طول بیانجامد چون سبب از دست دادن آب و املاح بدن می شود.

۵- این دارو ممکن است سبب ضعف و گیجی شود بنابراین احتیاط لازم در هنگام رانندگی و کار با دستگاه ها بعمل آید.

۶- در زمان مصرف این دارو تا پایان اثر آن از دسترسی به سرویس بهداشتی اطمینان حاصل گردد.

**تداخلات دارویی:**

این دارو به دلیل افزایش سرعت تخلیه دستگاه گوارش جذب خوراکی داروهای مانند ضدصرع ها، ضدبارداری ها، ضددیابت، آنتی بیوتیک ها را کاهش می دهد. بنابراین توصیه می شود داروهای دیگر حداقل ۲ ساعت قبل و یا ۶ ساعت بعد از پایان تخلیه کولون مصرف گردند.

- اثر تخلیه کولون پیکوسولفات با ملین های حجم دهنده کاهش می یابد.

- داروهای موثر بر فعالیت کلیه مانند مدرها، مهارکننده های آنژیوتانسین و مهارکننده های رسیپتور آنژیوتانسین و ضدالتهاب های غیراستروئیدی که سبب تجمع منیزیم در بدن می شوند، داروهای مانند گلیکوزیدهای قلبی که عملکرد آنها با پتاسیم خون ارتباط دارد و سایر داروهای که احتباس آب و الکترولیت را تحت تاثیر قرار می دهند مانند ضداسفردگی های موثر بر سروتونین کاربامازپین و ضداسفردگی ها

- در مصرف همزمان با سایر داروهای مسهل خصوصاً مکمل های اسموتیک احتیاط لازم بعمل آید.

**عوارض جانبی:**

- تشنگی و خشکی دهان، ضعف و خستگی، اختلالات خواب، نفخ، درد شکم و تبوع

**موارد منع مصرف:**

۱- در بیماران با تصفیه کراتین کمتر از  $30 \text{ ml/min}$

۲- در بیماران دارای بیماری انسدادی دستگاه گوارش

۳- در بیماران مشکوک به جراثیم و پارگی در سیستم گوارش

۴- در بیماران دارای کولیت اولسراتیو شدید و کرون و ایلوس ileus

۵- بیماران با سابقه جراحی گوارش مانند جراحی آپاندیس و بیماران مبتلا به آپاندیسیت، بیماران دچار مشکل در تخلیه معده، بیماران مبتلا به رابدومیولیزیس، بیماران مبتلا به نارسایی احتقانی قلب، بیماران دچار بی آبی مفرط، افزایش منیزیم خون تبوع، استفراغ، آسیت

۶- حساسیت به هر یک از اجزا، فرآورده

**شرایط نگهداری:**

دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

در دمای کمتر از  $30^\circ \text{C}$  سه سانتیگراد و به دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

**محل ساخت و بسته بندی:**

صاحب پروانه: شرکت داروسازی گیلارانکو

تولید کننده: شرکت کیهان دارو شیمی

شرکت داروسازی گیلارانکو  
G.L.C. ایران - رشت

www.gilaranco.com  
Email: info@gilaranco.com

@gilaranco  
@gilaranco1