



نیکسترتین® ۱ درصد

پرمترین شامپو

دسته دارویی: ضد شپش

موارد مصرف: شامپو نیکسترتین® برای درمان آلودگی ناشی از شپش سر انسانی بکار برده می شود.

مقدار و نحوه مصرف:

مصرف یکبار از این دارو اغلب برای بیماران مبتلا به شپش سر نتیجه درمانی مثبت دارد. هنگام استفاده از این دارو به هیچ وجه از درمان های سنتی مانند استفاده از سرکه و... بدلیل احتمال کاهش اثر دارو استفاده نگردد. ضمناً مصرف این دارو در انسان کمترین حد سمیت را نسبت به سایر فرآورده های مشابه دارد.

طریقه مصرف:

ابتدا باید موها را با یک شامپوی دیگر (بدون نرم کننده و حالت دهنده) بخوبی بشوید و سپس موها را بخوبی آب کشیده و تا حدی که فقط آب موها گرفته شود، خشک نمایید. آنگاه مقدار کافی از شامپو نیکسترتین® (برای موهای بلند شامپوی کامل، برای موهای متوسط ۳/۴ شامپو و برای موهای کوتاه از نصف شامپو) روی موهای نم دار بدون استفاده از آب اضافی استفاده نمایید، تمام موها و پوست سر بخوبی به شامپو آغشته شود و اجازه دهید ۱۰ دقیقه در همان حالت باقی بماند سپس موها را شسته و بخوبی آب بکشید. تا ۲ روز از شستن موها خودداری کنید. اگر پس از یک هفته شپش زنده در موی سر مشاهده شد، درمان تکرار شود.

نحوه شانه کردن:

موهای سر را به چند قسمت تقسیم نموده و هر قسمت را طبق روش زیر شانه نمایید. ابتدا موی سر را با شانه معمولی شانه کنید تا موها صاف و گره مو باز شود. سپس از شانه دندان ریز موجود در بسته بندی به روش زیر برای جدا کردن تخم شپش و شپش های مرده استفاده کنید. سپس نوک شانه دندان ریز را به سمت خود گرفته و مقداری از موی سر را از کف سر به صورتی که شانه ابتدا چسبیده به کف سر باشد، به سمت انتهای مو شانه نمایید. بعد از هر بار شانه کردن با دستمال کاغذی شپش ها را از شانه جدا کنید و دستمال کاغذی را در کیسه پلاستیکی بریزید. موهای شانه شده را با یک کلیپس از قسمت های شانه نشده جدا نموده و قسمت های دیگر مو را به همین ترتیب تا شانه شدن تمامی موها ادامه دهید. سپس کلیپس ها را جدا نموده و مجدداً موها را با آب گرم شستشو دهید.

نکات قابل توصیه:

- ۱- قبل از مصرف فرآورده را به خوبی تکان دهید.
- ۲- تمام لباسها، ملحفه ها و حوله های بیمار باید با آب داغ شسته و یا با اسپری ویژه البسه درمین® آغشته گردد.
- ۳- تمامی افراد خانواده فرد مبتلانی همزمان باید درمان گردند.
- ۴- برای جلوگیری از گسترش آلودگی، شانه و برس را نیز با شامپو نیکسترتین® بشوید.
- ۵- از تماس دارو با چشم و دهان خودداری گردد.
- ۶- از مصرف شامپو نیکسترتین® بطور معمولی و مرتب اجتناب شود.
- ۷- این دارو برای استعمال خارجی است.
- ۸- دور از دسترس اطفال نگهداری گردد.
- ۹- از مصرف دارو روی زخمهای باز، خراشیدگی و بریدگیها اجتناب گردد.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی خود اثرات جانبی را نیز به همراه دارد که تمامی این عوارض به یک باره در یک فرد ظاهر نمی شود. احساس سوزش، گزش، اریتم و راش ممکن است ظاهر شود.

مصرف در بارداری: در صورت نیاز مبرم، استفاده از دارو حداکثر دوبار در تمام طول آبستنی و شیردهی مجاز می باشد.

مصرف در کودکان: در کودکان کوچکتر از ۲ ماه سن مصرف نگردد.

مرحله دوم: حذف

مرحله اول: درمان



@gilaranco
@gilaranco_pharma

G.L.C.
شرکت داروسازی گیلارانکو
ایران - رشت

www.gilaranco.com