

کامترین ۵ درصد پرمترین

کرم موضعی

طبقه بندی درمانی داروی
خط اول در درمان گال

مکانیسم اثر و فارماکوکینتیک:

پرمترین ماده موثره کرم کامترین از طریق تاثیر روی غشاء سلول های عصبی و مختل کردن جریانهای سدیم سبب تاخیر در ریپلاریزاسیون و در نتیجه فلج انگل های مورد نظر می شود. پرمترین از طریق هیدرولیز استری به سرعت به متابولیت های غیر فعال متابولیزه میشود که عمدتاً از طریق ادرار دفع می شوند. نتایج مطالعات نشان داده اند که حدود ۲ درصد یا کمتر از مقدار کرم مصرف شده جذب می شود اثر دارو حداقل به مدت ۱۰ روز بعد از یکبار استعمال دارو روی بدن باقی میماند.

موارد مصرف:

کرم کامترین ۵ درصد برای درمان آلودگی به انگل *Sarcoptes Scabiei* (عامل بیماری گال) به کار میرود.

موارد منع مصرف:

این دارو در افرادی که سابقه هرگونه حساسیت به اجزا به کار رفته در تهیه آن و داروهای مشابه دارند، نباید مصرف شود.



5.73 cm

3.3cm

هشدارها و احتیاط های لازم:

مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی باید طبق نظر پزشک انجام شود. این دارو تنها برای استعمال خارجی است، خارش قرمزی و ادم که معمولاً همراه این بیماری است ممکن است در صورت استفاده از کرم کامترین برای مدت کوتاهی تشدید شود.

عوارض جانبی:

معمول ترین عارضه همراه با مصرف این دارو خارش است. همچنین احساس سوزش خفیف و گذرا، قرمزی بی حسی و راش هم ممکن است در مصرف این دارو مشاهده شود.

مقدار و نحوه مصرف:

مقدار مورد نظر از کرم را از گردن تا کف پا به طور کامل روی پوست بمالید و ماساژ دهید و پس از ۸ تا ۱۴ ساعت روی پوست را بشویید.

نوع بسته بندی:

بطری ۶۰ گرمی

شرایط نگهداری:

دور از دسترس اطفال و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری شود. از یخ زدگی محافظت شود.

منبع:

1. USP DI, 2004
2. PDR, 58th Ed 2004
3. Drug

12.9 cm